



برنامه غذایی گوجه فرنگی

اولین آب بعد از انتقال نشاء به زمین اصلی (کیلوگرم-لیتر/هکتار)	۱- ۳ لیتر NPK 20-20-20 مایع
	۲- ۲۰ کیلوگرم NPK 10-52-10 +TE
ابتدای فاز رشد رویشی (مرحله چهار برگ)	۱- ۲ لیتر کود مایع ۱۲٪ روی
(کیلوگرم-لیتر/هکتار)	۲- ۳ لیتر کود مایع اسید آمینه
	۳- ۲۰ کیلوگرم NPK 10-52-10+TE
قبل از گلدهی (کیلوگرم-لیتر/هکتار)	۱- ۲۰ کیلوگرم NPK 20-20-20
	۲- ۱ لیتر کود مایع آمینواسید
	۳- ۴ لیتر کود مایع ۳۰٪ نیترژن
ابتدای فاز گلدهی (کیلوگرم-لیتر/هکتار)	۱- ۲۰ کیلوگرم مونو فسفات پتاسیم
	۲- ۲ لیتر کود مایع حاوی ۱۲٪ روی
	۳- ۲ لیتر کود مایع آمینواسید
فاز تشکیل میوه (لیتر/هکتار)	۱- ۴ لیتر کود هایپر پتاس ۴۰٪
	۲- ۳ لیتر کود مایع ۳۰٪ نیترژن
	۳- ۲ لیتر کود مایع آمینو اسید
دو یا سه روز قبل از برداشت (لیتر/هکتار)	۱- ۳ لیتر کود مایع هایپر پتاس ۴۰٪
	۲- ۲ لیتر کود مایع ۱۵٪ کلسیم